



# Das unbestechliche Trio

## Diniro®



Das Breitband-Herbizid  
mit Gräserwirkung

### HERBIZID

|   |                                                    |   |                              |   |                                                                  |
|---|----------------------------------------------------|---|------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|
| + | Einzigartige Wirkstoffkombination in einem Produkt | + | Sehr schnelle Anfangswirkung | + | Erfasst auch schwer bekämpfbare Ackerwinde sowie Windenknöterich |
|---|----------------------------------------------------|---|------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|

|                                                             |                                                                                               |                                                              |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Wirkstoffe</b>                                           | 100 g/kg Nicosulfuron, 40 g/kg Prosulfuron, 400 g/kg Dicamba                                  |                                                              |  |  |  |
| <b>Formulierung</b>                                         | Wasserdispergierbares Granulat (WG)                                                           |                                                              |  |  |  |
| <b>Wirkstoffgruppe</b>                                      | Nicosulfuron: Sulfonylharnstoff                                                               | HRAC 2                                                       |  |  |  |
|                                                             | Prosulfuron: Sulfonylharnstoff                                                                | HRAC 2                                                       |  |  |  |
|                                                             | Dicamba: Synthetische Auxine                                                                  | HRAC 4                                                       |  |  |  |
| <b>Wirkmechanismus</b>                                      | Nico- und Prosulfuron:<br>ALS-Hemmer, Hemmung der Acetolactat-Synthase<br>Dicamba: Wuchsstoff |                                                              |  |  |  |
| <b>Wirkstoffaufnahme/-verteilung</b>                        | Blatt- und Bodenwirkung; systemisch                                                           |                                                              |  |  |  |
| <b>Kulturen (Stadien)</b>                                   | Mais (BBCH 12–18)                                                                             |                                                              |  |  |  |
| <b>Indikationen</b>                                         | Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter                                |                                                              |  |  |  |
| <b>Anwendungszeitpunkt/Aufwandmenge</b>                     | Nachauflauf, 0,4 kg/ha (+ 1,2 l/ha Adigor®)                                                   |                                                              |  |  |  |
| <b>Abstandsauflagen</b><br>Weitere Auflagen im Tabellenteil | Hang > 2 %:                                                                                   | 0m                                                           |  |  |  |
|                                                             | Oberflächengewässer                                                                           | NW605-1: 5 m (50 %),<br>Länderrecht (75 %, 90 %), NW606: 5 m |  |  |  |
|                                                             | Saumstrukturen                                                                                | NT109: min. 5 m (90 %);<br>25 m (Standard)                   |  |  |  |
| <b>Bienenschutz</b>                                         | Nicht bienengefährlich (B4)                                                                   |                                                              |  |  |  |
| <b>Gebindegröße</b>                                         | 2,4 kg Diniro® + (2 x 3,6 l) Adigor®                                                          |                                                              |  |  |  |

### Diniro® – Anwendungsempfehlung im Mais

|                                                                                              | BBCH 12                                                    | 13 | 14 | 18 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|----|----|
| <b>Ungräser inkl.<br/>Ackerfuchsschwanz,<br/>Quecke etc. +<br/>dikotyle Problemunkräuter</b> |                                                            |    |    |    |
|                                                                                              | Diniro® 0,4 kg/ha + Adigor® 1,2 l/ha                       |    |    |    |
| <b>Die Komplettlösung:<br/>Ungräser + Unkräuter</b>                                          |                                                            |    |    |    |
|                                                                                              | Diniro® 0,4 kg/ha + Adigor® 1,2 l/ha + Successor® T 3 l/ha |    |    |    |