



**Wirkstoff: 250 g/l Azoxystrobin (23,2 Gew.-%)**

**Wirkungsmechanismus (FRAC-Gruppe): C3**

**Formulierung: Suspensionskonzentrat (SC)**

## WIRKUNGSWEISE

Zaftra® AZT 250 SC enthält den Wirkstoff Azoxystrobin, der zur chemischen Gruppe der  $\beta$ -Methoxyacrylate (Strobilurinderivate) gehört. Er ist breit wirksam gegen wichtige Krankheiten an vielen Kulturen. Azoxystrobin hat in Pflanzen systemische und translaminare Eigenschaften. Azoxystrobin hemmt den Elektronentransport in der Mitochondrienatmung der Schadpilze.

Die Wirkung von Azoxystrobin ist in erster Linie protektiv, der Wirkstoff muss daher vor oder zum Infektionsbeginn eingesetzt werden.

**Wirkungsmechanismus (FRAC-Code): C3**

## WIRKUNGSSPEKTRUM

### Raps

Rapsschwärze (*Alternaria brassicae*)

Weißstängeligkeit (*Sclerotinia sclerotiorum*)

### Hopfen

Falscher Mehltau (*Pseudoperonospora humuli*) (Sekundärinfektionen)

### Kartoffel

Alternaria-Arten (*Alternaria spp.*)

*Rhizoctonia solani*

*Colletotrichum coccodes*

### Futtererbse

Brennfleckenkrankheit (*Ascochyta pisi*)

### Zuckerrübe, Futterrübe

*Cercospora beticola*

### Spargel (Jung- und Ertragsanlagen)

Laubkrankheit (*Stemphylium botryosum*)

Spargelrost (*Puccinia asparagi*)

### Gurke (Freiland, Gewächshaus)

Echter Mehltau (*Erysiphe cichoracearum* und *Sphaerotheca fuliginea*)

Falscher Mehltau (*Pseudoperonospora cubensis*)

### Tomate (Gewächshaus)

Echter Mehltau (*Leveillula taurica*)

Kraut- und Braunfäule (*Phytophthora infestans*)

Samtfleckenkrankheit (*Fulvia fulva*)

### Zucchini (Freiland)

Echter Mehltau (*Erysiphe cichoracearum* und *Sphaerotheca fuliginea*)

### Zierpflanzen (Freiland, Gewächshaus)

Rostpilze

### **Salate, Endivien (Freiland)**

Falscher Mehltau (*Bremia lactucae*)

*Rhizoctonia solani*

### **Blattkohl, Blumenkohl, Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl), Rosenkohl (Freiland)**

Kohlschwärze (*Alternaria brassicicola*)

Kohlschwärze (*Alternaria brassicae*)

Weißer Rost (*Albugo candida*)

*Mycosphaerella brassicicola*

### **Möhre (Freiland)**

Echter Mehltau (*Erysiphe heraclei*)

Möhrenschwärze (*Alternaria dauci*)

Blattfleckenkrankheit (*Cercospora carotae*)

## **KULTURVERTRÄGLICHKEIT**

Nach bisherigen Erfahrungen wird Zaftra® AZT 250 SC von allen Raps-, Zuckerrüben-, Futterrüben- und Futtererbsensorten sehr gut vertragen.

Erkenntnisse über Unverträglichkeiten von Zaftra® AZT 250 SC bei Spargel-, Blattkohl-, Blumenkohl-, Salat-, Möhren-, Kopfkohl-, Rosenkohl- und Zucchiniarten liegen nicht vor.

Im Gewächshaus können Behandlungen unter Einsatzbedingungen bei denen der Spritzbelag nur langsam antrocknet (Spritzungen bei hoher Luftfeuchte, niedrigen Temperaturen oder in den Abendstunden) an empfindlichen Arten (z. B. Tomaten) zu Pflanzenschäden führen. Auch junge Sämlinge oder gestresste Pflanzen sind besonders empfindlich.

### **Hopfen**

Erkenntnisse über Unverträglichkeiten von Zaftra® AZT 250 SC bei Hopfensorten liegen nicht vor.

### **Kartoffeln**

Blattbehandlung gegen Alternaria-Blattdürre (*Alternaria solani*, *Alternaria alternata*): Nach bisherigen Erfahrungen wird Zaftra® AZT 250 SC von allen Kartoffelsorten sehr gut vertragen.

Furchenbehandlung gegen Wurzelötterkrankheit (*Rhizoctonia solani*) und Knollenwelke (*Colletotrichum coccodes*): Kulturschäden sind möglich. Insbesondere bei Verwendung von vorgeschädigtem oder keim schwachem Pflanzgut auf Sandböden (Bodenartenkennung „S“) mit niedrigem Humusgehalt sowie bei ungünstigen Witterungsbedingungen. Nach der Pflanzung können Auflaufverzögerungen auftreten, die sich in der Regel bis zum Reihenschluss wieder auswachsen. Im ungünstigsten Fall sind Fehlstellen möglich. Alle Maßnahmen, die das zügige Auflaufen der Kartoffeln fördern, tragen zu guter Verträglichkeit der Zaftra® AZT 250 SC-Furchenbehandlung bei. Auf sorptionschwachen Sandböden verringert eine Aufwandmenge von 2,0 l/ha Zaftra® AZT 250 SC das Risiko von Auflaufverzögerungen.

### **Gurken (Freiland, Gewächshaus)**

In Abhängigkeit von Kultur, Sorte und dem Anbauverfahren können Schäden an der zu behandelnden Kultur nicht ausgeschlossen werden. Vor einem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit unter den betriebspezifischen Bedingungen zu prüfen.

### **Tomaten (Gewächshaus)**

Nicht einsetzen bei akuten oder zu erwartenden Temperaturen über 27° C und im geschützten Anbau bei unzureichender Belüftung (z. B. unter Folie).

### **Zierpflanzen**

Bei Zierpflanzen wird wegen der Vielfalt der Arten und Sorten und der unterschiedlichen Kultur- und Anwendungsbedingungen dringend empfohlen, einen Probeeinsatz vorzunehmen, bevor größere Bestände behandelt werden. Ab dem Knospenöffnen können einige Zierpflanzenarten besonders empfindlich reagieren. Bekannt ist dies bei Usambaraveilchen.

Kultur/ Anwendungszeitpunkt	Schadorganismus, Aufwandmenge, Anwendungstechnik, Wartezeit, Wichtige Hinweise, Auflagen
<b>Raps, Freiland</b> <b>BBCH 51-69</b> Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	<b>Rapsschwärze (<i>Alternaria brassicae</i>)</b> - 1,0 l/ha in 200 bis 400 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 1, in der Kultur bzw. je Jahr: 1 - Spritzen - F
<b>Raps, Freiland</b> <b>BBCH 61-69</b> Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis	<b>Weißstängeligkeit (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)</b> - 1,0 l/ha in 200 bis 400 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 1, in der Kultur bzw. je Jahr: 1 - Spritzen - F
<b>Zuckerrübe, Futterrübe, Freiland</b> <b>BBCH 39-49</b> Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	<b><i>Cercospora beticola</i></b> - 1,0 l/ha in 200 bis 400 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 14-28 Tage - Spritzen - 35 Tage
<b>Futtererbse, Freiland</b> <b>BBCH 51-75</b> Tenderometerwert: 105 Te Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	<b>Brennfleckenkrankheit (<i>Ascochyta pisi</i>)</b> - 1,0 l/ha in 200 bis 400 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 14-28 Tage - Spritzen - 35 Tage
<b>Tomate, Gewächshaus</b> <b>BBCH 21-89</b> Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	<b>Echter Mehltau (<i>Leveillula taurica</i>),            Kraut- und Braunfäule (<i>Phytophthora infestans</i>),            Samtfleckenkrankheit (<i>Fulvia fulva</i>)</b> - Pflanzengröße bis 50 cm: 0,48 l/ha in max. 600 l/ha Wasser Pflanzengröße 50 bis 125 cm: 0,72 l/ha in max. 900 l/ha Wasser Pflanzengröße über 125 cm: 0,96 l/ha in max. 1.200 l/ha Wasser max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 8-12 Tage - Spritzen - 3 Tage <b>WW750, WW764</b>
<b>Gurke, Freiland</b> <b>BBCH 21-89</b> Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	<b>Echter Mehltau (<i>Erysiphe cichoracearum</i>),            Echter Mehltau (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)</b> - 1,0 l/ha in 300 bis 600 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 8-12 Tage - Spritzen - 3 Tage <b>WW750, WW764</b>

Kultur/ Anwendungszeitpunkt	Schadorganismus, Aufwandmenge, Anwendungstechnik, Wartezeit, Wichtige Hinweise, Auflagen
<p><b>Gurke, Gewächshaus</b> <b>BBCH 21-89</b> Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome</p>	<p><b>Echter Mehltau (<i>Erysiphe cichoracearum</i>), Echter Mehltau (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)</b> - Pflanzengröße bis 50 cm: 0,48 l/ha in max. 600 l/ha Wasser Pflanzengröße 50 bis 125 cm: 0,72 l/ha in max. 900 l/ha Wasser Pflanzengröße über 125 cm: 0,96 l/ha in max. 1.200 l/ha Wasser max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 8-12 Tage - Spritzen - 3 Tage <b>WW750, WW764</b></p>
<p><b>Zucchini, Freiland</b> <b>BBCH 21-89</b> Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome</p>	<p><b>Echter Mehltau (<i>Erysiphe cichoracearum</i>), Echter Mehltau (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)</b> - 1,0 l/ha in 200 bis 600 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 8-12 Tage - Spritzen - 3 Tage <b>WW750, WW764</b></p>
<p><b>Blumenkohl, Blattkohl, Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl), Rosenkohl, Freiland</b> <b>BBCH 41-49</b> Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome</p>	<p><b>Kohlschwärze (<i>Alternaria brassicicola</i>), Alternaria brassicae, Weißer Rost (<i>Albugo candida</i>), Mycosphaerella brassicicola</b> - 1,0 l/ha in 200 bis 600 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 8-12 Tage - Spritzen - Blumenkohl: 10 Tage; Brokkoli, Blattkohle, Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl): 14 Tage <b>WW750, WW764</b></p>
<p><b>Salate, Endivien, Freiland</b> <b>BBCH 41-49</b> Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis</p>	<p><b>Falscher Mehltau (<i>Bremia lactucae</i>), Rhizoctonia solani</b> - 1,0 l/ha in 200 bis 600 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 8-12 Tage - Spritzen - 14 Tage <b>WW750, WW764</b></p>
<p><b>Möhre, Freiland</b> <b>BBCH 13-49</b> Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome</p>	<p><b>Echter Mehltau (<i>Erysiphe heraclei</i>), Möhrenschwärze (<i>Alternaria dauci</i>), Blattfleckenkrankheit (<i>Cercospora carotae</i>)</b> - 1,0 l/ha in 200 bis 600 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 7-10 Tage - Spritzen - 14 Tage <b>WW750, WW764</b></p>

Kultur/ Anwendungszeitpunkt	Schadorganismus, Aufwandmenge, Anwendungstechnik, Wartezeit, Wichtige Hinweise, Auflagen
<b>Zierpflanzen, Freiland, Gewächshaus BBCH 13-91</b> Bei Befallsgefahr	<b>Rostpilze</b> - Pflanzengröße bis 50 cm: 0,48 l/ha in max. 600 l/ha Wasser Pflanzengröße 50 bis 125 cm: 0,72 l/ha in max. 900 l/ha Wasser Pflanzengröße über 125 cm: 0,96 l/ha in max. 1.200 l/ha Wasser max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 8-12 Tage - Spritzen - N <b>WW750, WW764</b>
<b>Spargel, Freiland</b> Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	<b>Spargelrost (<i>Puccinia asparagi</i>), Laubkrankheit (<i>Stemphylium botryosum</i>)</b> - 1,0 l/ha in 600 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 8-12 Tage - Spritzen - F <b>WW750, WW764</b>
<b>Kartoffel, Freiland BBCH 31-91</b> Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	<b>Alternaria Arten (<i>Alternaria sp.</i>)</b> - 0,5 l/ha in 200 bis 600 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 3, in der Kultur bzw. je Jahr: 3, Abstand: 7-28 Tage - Spritzen - 7 Tage <b>WW750, WW760, WW762</b>
<b>Kartoffel, Freiland</b> Beim Legen	<b><i>Rhizoctonia solani</i>, <i>Colletotrichum coccodes</i> (nur zur Befallsminderung)</b> - 3 l/ha in 150 bis 200 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 1, in der Kultur bzw. je Jahr: 3 - Spritzen - F <b>WW760, WW762</b>
<b>Hopfen, Freiland BBCH 31-89</b> Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis	<b>Falscher Mehltau (<i>Pseudoperonospora humuli</i>) (Sekundärinfektion)</b> - bis BBCH 37: 0,75 l/ha in 1.000 bis 4.200 l/ha Wasser, bis BBCH 55: 1,0 l/ha, über BBCH 55: 1,6 l/ha, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 8-14 Tage - Spritzen - 28 Tage <b>Hinweis zum Mittelaufwand:</b> pro Vegetationsperiode max. 3,2 l/ha Mittel. <b>WW750, WW764</b>

**Wartezeit F:** Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.

**Wartezeit N:** Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung.

**WW750:** Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

**WW760:** Eingeschränkte Wirksamkeit möglich.

**WW762:** Aus Gründen des Resistenzmanagements das Mittel (einschließlich anderer Mittel mit gleichem Wirkstoff, mit einem Wirkstoff aus der gleichen Wirkstoffgruppe oder mit kreuzresistentem Wirkstoff) insgesamt nicht häufiger anwenden als in der Gebrauchsanleitung angegeben. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

**WW764:** Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel im Wechsel mit anderen Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen verwenden.

#### **VON DER ZULASSUNGSBEHÖRDE GEMÄSS ART. 51 DER VERORDNUNG (EG) NR. 1107/2009 GENEHMIGTE ANWENDUNGSGEBIETE WICHTIGER HINWEIS:**

Zusätzlich zu den festgesetzten Anwendungsgebieten hat die Zulassungsbehörde die Anwendung dieses Produktes in weiteren Anwendungsgebieten genehmigt. Bei der Anwendung des Mittels in genehmigten Anwendungsgebieten ist zu beachten, dass die Prüfung der Wirksamkeit des Mittels in dem genehmigten Anwendungsgebiet und möglicher Schaden an Kulturpflanzen grundsätzlich nicht Gegenstand des Genehmigungsverfahrens der deutschen Zulassungsbehörde und daher nicht ausreichend ausgetestet und geprüft ist. Mögliche Schäden auf Grund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an den Kulturpflanzen liegen somit nicht im Verantwortungsbereich des Herstellers, sondern ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Die Wirksamkeit und Pflanzenverträglichkeit des Mittels sind daher vom Anwender vor der Ausbringung des Mittels ausreichend zu prüfen.

<b>Kultur/ Anwendungszeitpunkt</b>	<b>Schadorganismus, Aufwandmenge, Anwendungstechnik, Wartezeit, Wichtige Hinweise, Auflagen</b>
<b>Radieschen, Rettich, Gewächshaus Ab BBCH 10</b> Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	<b>Weißer Rost (<i>Albugo candida</i>), Falscher Mehltau (<i>Peronospora parasitica</i>), Pilzliche Blattfleckenerreger</b> - 1,0 l/ha in 400 bis 600 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 1, in der Kultur bzw. je Jahr: 1 - Spritzen - 21 Tage <b>WW750, WW764</b>
<b>Stangenbohne, Freiland Ab BBCH 13</b> Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis	<b>Brennfleckenkrankheit (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>), Weißstängeligkeit (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), Bohnenrost (<i>Uromyces appendiculatus</i>)</b> - Pflanzengröße bis 50 cm: 1,0 l/ha in 600 l/ha Wasser, Pflanzengröße 50 bis 125 cm: 1,5 l/ha in 900 l/ha Wasser, Pflanzengröße über 125 cm: 2,0 l/ha in 1.200 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 10-14 Tage - Spritzen - 7 Tage <b>WW750, WW764</b>

Kultur/ Anwendungszeitpunkt	Schadorganismus, Aufwandmenge, Anwendungstechnik, Wartezeit, Wichtige Hinweise, Auflagen
<b>Kohlrabi, Freiland</b> <b>Ab BBCH 13</b> Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis	<b>Pilzliche Blattfleckenerreger, Weißer Rost (<i>Albugo candida</i>),            Falscher Mehltau (<i>Peronospora parasitica</i>)</b> -1,0 l/ha in 400 bis 600 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 10-14 Tage - Spritzen - 14 Tage <b>WW750, WW764</b>
<b>Knollensellerie, Freiland</b> <b>Knollensellerie (Nutzung als Bundsellerie), Freiland</b> <b>Ab BBCH 13</b> Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis	<b>Blattfleckenkrankheit (<i>Septoria apiicola</i>),            Sellerierost (<i>Puccinia apii</i>)</b> -1,0 l/ha in 300 bis 600 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 7-14 Tage - Spritzen - 14 Tage <b>WW750, WW764</b>
<b>Radieschen, Rettich, Freiland</b> <b>Ab BBCH 10</b> Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis	<b>Weißer Rost (<i>Albugo candida</i>),            Falscher Mehltau (<i>Peronospora parasitica</i>),            Pilzliche Blattfleckenerreger</b> -1,0 l/ha in 300 bis 600 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 7-14 Tage - Spritzen - 14 Tage <b>WW750, WW764</b>
<b>Endivien, Salate, Gewächshaus</b> <b>Bis BBCH 18</b> Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis	<b><i>Rhizoctonia solani</i></b> -1,0 l/ha in 300 bis 400 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 1, in der Kultur bzw. je Jahr: 1, - Spritzen - F <b>WW750, WW764</b>
<b>Gemüsefenchel, Freiland</b> <b>Ab BBCH 13</b> Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis	<b>Pilzliche Blattfleckenerreger</b> -1,0 l/ha in 400 bis 600 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 7-14 Tage - Spritzen - 14 Tage <b>WW750, WW764</b>
<b>Schnittlauch (Bulbenanzucht), Freiland</b> <b>Ab BBCH 13</b> Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	<b>Rost (<i>Puccinia allii</i>)</b> -1,0 l/ha in 200 bis 600 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 14-21 Tage - Spritzen - F <b>WW750, WW764</b>

Kultur/ Anwendungszeitpunkt	Schadorganismus, Aufwandmenge, Anwendungstechnik, Wartezeit, Wichtige Hinweise, Auflagen
<p><b>Porree, Freiland</b> <b>Ab BBCH 13</b> Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome</p>	<p><b>Rost (<i>Puccinia allii</i>) (Blattfleckenkrankheit),</b> <b>Alternaria Arten (<i>Alternaria sp.</i>),</b> <b>Papierfleckenkrankheit (<i>Phytophthora porri</i>),</b> <b>Blattfleckenkrankheit (<i>Cladosporium allii</i>)</b> - 1,0 l/ha in 200 bis 400 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 7-10Tage - Spritzen - 21 Tage <b>WW750, WW764</b></p>
<p><b>Speisezwiebel</b> <b>(Nutzung als</b> <b>Trockenzwiebel)</b> <b>Freiland</b> <b>Ab BBCH 13</b> Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome</p>	<p><b>Falscher Mehltau (<i>Peronospora destructor</i>),</b> <b>Mehlkrankheit (<i>Sclerotium cepivorum</i>),</b> <b>Blattfleckenkrankheit (<i>Cladosporium allii</i>)</b> - 1,0 l/ha in 200 bis 400 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 7-10Tage - Spritzen - 14 Tage <b>WW750, WW764</b></p>
<p><b>Knoblauch, Freiland</b> <b>Ab BBCH 13</b> Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome</p>	<p><b>Falscher Mehltau (<i>Peronospora destructor</i>)</b> <b>Mehlkrankheit (<i>Sclerotium cepivorum</i>)</b> <b>Blattfleckenkrankheit (<i>Cladosporium allii</i>)</b> <b>Rost (<i>Puccinia allii</i>)</b> - 1,0 l/ha in 200 bis 400 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 7-10Tage - Spritzen - 14 Tage <b>WW750, WW764</b></p>
<p><b>Schalotte, Freiland</b> <b>Ab BBCH 13</b> Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome</p>	<p><b>Falscher Mehltau (<i>Peronospora destructor</i>),</b> <b>Mehlkrankheit (<i>Sclerotium cepivorum</i>)</b> - 1,0 l/ha in 200 bis 600 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 7-10Tage - Spritzen - 14 Tage <b>WW750, WW764</b></p>

Kultur/ Anwendungszeitpunkt	Schadorganismus, Aufwandmenge, Anwendungstechnik, Wartezeit, Wichtige Hinweise, Auflagen
<b>Zwiebelgemüse</b> <b>(Nutzung als</b> <b>Bundzwiebeln),</b> <b>Freiland</b> <b>Ab BBCH 13</b> Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	<b>Blattfleckenkrankheit (<i>Cladosporium allii</i>),</b> <b>Purpurfleckenkrankheit (<i>Alternaria porri</i>),</b> <b>Falscher Mehltau (<i>Peronospora destructor</i>),</b> <b>Rost (<i>Puccinia allii</i>)</b> - 1,0 l/ha in 200 bis 600 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 8-12 Tage - Spritzen - 7 Tage <b>WW750, WW764</b>
<b>Gemüsepaprika,</b> <b>Gewächshaus</b> <b>Ab BBCH 21</b> Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	<b>Echter Mehltau (<i>Leveillula taurica</i>),</b> <b><i>Phytophthora capsici</i>, Alternaria Arten (<i>Alternaria sp.</i>),</b> <b>Samtfleckenkrankheit (<i>Cladosporium capsici</i>),</b> <b><i>Sclerotinia sclerotiorum</i></b> - Pflanzengröße bis 50 cm: 0,48 l/ha in 600 l/ha Wasser, Pflanzengröße 50 bis 125 cm: 0,72 l/ha in 900 l/ha Wasser, Pflanzengröße über 125 cm: 0,96 l/ha in 1.200 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 8-12 Tage - Spritzen - 3 Tage <b>WW750, WW764</b>
<b>Bleichsellerie, Freiland</b> <b>und Gewächshaus</b> <b>Ab BBCH 13</b> Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	<b>Blattfleckenkrankheit (<i>Septoria apiicola</i>),</b> <b>Sellerierost (<i>Puccinia apii</i>)</b> - 1,0 l/ha in 200 bis 600 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 10-14 Tage - Spritzen - 14 Tage <b>WW750, WW764</b>
<b>Chicoree, Freiland</b> <b>Ab BBCH 13</b> Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	<b>Rost (<i>Puccinia cichorii</i>), Echter Mehltau</b> <b>(<i>Erysiphe cichoracearum</i>)</b> - 1,0 l/ha in 200 bis 600 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: mindestens 21 Tage - Spritzen - F <b>WW750, WW764</b>
<b>Buschbohne, Freiland</b> <b>Ab BBCH 21</b> Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	<b>Brennfleckenkrankheit (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>),</b> <b><i>Sclerotinia sclerotiorum</i>, Rostpilze</b> - 1,0 l/ha in 200 bis 600 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 10-14 Tage - Spritzen - 7 Tage <b>WW750, WW764</b>

Kultur/ Anwendungszeitpunkt	Schadorganismus, Aufwandmenge, Anwendungstechnik, Wartezeit, Wichtige Hinweise, Auflagen
<p><b>Dicke Bohne, Freiland</b> <b>Ab BBCH 21</b> Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome</p>	<p><b>Brennfleckenkrankheit (<i>Ascochyta fabae</i>), <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>, Rostpilze</b> - 1,0 l/ha in 200 bis 600 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 10-14 Tage - Spritzen - 14 Tage</p>
<p><b>Meerrettich, Freiland</b> <b>Ab BBCH 13</b> Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome</p>	<p><b>Falscher Mehltau (<i>Peronospora parasitica</i>), Weißer Rost (<i>Albugo candida</i>), Blattfleckenkrankheit (<i>Alternaria raphani</i>)</b> - 1,0 l/ha in 200 bis 600 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 7-10 Tage - Spritzen - 10 Tage <b>WW750, WW764</b></p>
<p><b>Pastinak, Schwarzwurzel, Kohlrübe, Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.), Freiland</b> <b>Ab BBCH 13</b> Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome</p>	<p><b>Pilzliche Blattfleckererreger</b> - 1,0 l/ha in 200 bis 600 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 7-10 Tage - Spritzen - Pastinak, Schwarzwurzel: 10 Tage; Kohlrübe: 42 Tage; Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.): 14 Tage <b>WW750, WW764</b></p>
<p><b>Wurzelpetersilie, Freiland</b> <b>Ab BBCH 13</b> Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome</p>	<p><b>Blattfleckenkrankheit (<i>Septoria petroselini</i>)</b> - 1,0 l/ha in 200 bis 600 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 7-10 Tage - Spritzen - 10 Tage <b>WW750, WW764</b></p>
<p><b>Wurzelzichorie, Freiland</b> <b>Ab BBCH 13</b> Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome</p>	<p><b>Rost (<i>Puccinia cichorii</i>)</b> - 1,0 l/ha in 200 bis 600 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 7-10 Tage - Spritzen - 14 Tage <b>WW750, WW764</b></p>

Kultur/ Anwendungszeitpunkt	Schadorganismus, Aufwandmenge, Anwendungstechnik, Wartezeit, Wichtige Hinweise, Auflagen
<b>Beten (Rote, Gelbe, Weiße Bete), Freiland Ab BBCH 13</b> Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	<b>Blattfleckenkrankheit (<i>Cercospora beticola</i>)</b> - 1,0 l/ha in 200 bis 600 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 7-10 Tage - Spritzen - 42 Tage <b>WW750, WW764</b>
<b>Topinambur, Freiland Ab BBCH 13</b> Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	<b>Rost (<i>Puccinia helianthi</i>)</b> - 1,0 l/ha in 200 bis 600 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 7-10 Tage - Spritzen - 42 Tage <b>WW750, WW764</b>
<b>Frische Kräuter, Rucola-Arten, Freiland Ab BBCH 13</b> Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	<b>Pilzliche Blattfleckenerreger, Falsche Mehltaupilze (<i>Peronosporaceae</i>), Rostpilze</b> - 1,0 l/ha in 200 bis 600 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 8-12 Tage - Spritzen - 14 Tage <b>WW750, WW764</b>
<b>Zwiebelgemüse (Nutzung als Bundzwiebel), Freiland Ab BBCH 13</b> Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	<b>Mehlkrankheit (<i>Sclerotium cepivorum</i>),</b> - 1,0 l/ha in max. 1.000 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 8-12 Tage - Spritzen - 7 Tage <b>WW750, WW764</b>
<b>Aubergine, Gewächshaus Ab BBCH 21</b> Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	<b>Dürrfleckenkrankheit (<i>Alternaria solani</i>), Kraut- und Braunfäule (<i>Phytophthora infestans</i>)</b> - Pflanzengröße bis 50 cm: 0,48 l/ha in 600 l/ha Wasser, Pflanzengröße 50 bis 125 cm: 0,72 l/ha in 900 l/ha Wasser, Pflanzengröße über 125 cm: 0,96 l/ha in 1.200 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 8-12 Tage - Spritzen - 3 Tage <b>WW750, WW764</b>

Kultur/ Anwendungszeitpunkt	Schadorganismus, Aufwandmenge, Anwendungstechnik, Wartezeit, Wichtige Hinweise, Auflagen
<p><b>Melone, Gewächshaus Ab BBCH 21</b> Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome</p>	<p><b>Echter Mehltau (<i>Erysiphe cichoracearum</i>), Echter Mehltau (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>), Falscher Mehltau (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)</b> - Pflanzengröße bis 50 cm: 0,48 l/ha in 600 l/ha Wasser, Pflanzengröße 50 bis 125 cm: 0,72 l/ha in 900 l/ha Wasser, Pflanzengröße über 125 cm: 0,96 l/ha in 1.200 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 8-12 Tage - Spritzen - 3 Tage <b>WW750, WW764</b></p>
<p><b>Patisson, Kürbis- Hybriden, Freiland (mit genießbarer Schale) Ab BBCH 21</b> Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome</p>	<p><b>Echter Mehltau (<i>Erysiphe cichoracearum</i>), Echter Mehltau (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>), Falscher Mehltau (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)</b> - 1,0 l/ha in 200 bis 600 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 8-12 Tage - Spritzen - 3 Tage <b>WW750, WW764</b></p>
<p><b>Lupine-Arten, Freiland Ab BBCH 13</b> Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome</p>	<p><b><i>Colletotrichum</i></b> - 1,0 l/ha in 200 bis 400 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 14-28 Tage - Spritzen - 35 Tage</p>
<p><b>Ackerbohne, Freiland Ab BBCH 13</b> Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome</p>	<p><b><i>Botrytis fabae</i>, Falscher Mehltau (<i>Peronospora viciae</i>), Brennfleckenkrankheit (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>)</b> - 1,0 l/ha in 200 bis 400 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 14-28 Tage - Spritzen - 35 Tage</p>
<p><b>Phacelia (zur Saatguterzeugung), Freiland Ab BBCH 13</b> Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome</p>	<p><b><i>Botrytis</i>-Arten (<i>Botrytis spp.</i>)</b> - 1,0 l/ha in 200 bis 400 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 14-28 Tage - Spritzen - F</p>

Kultur/ Anwendungszeitpunkt	Schadorganismus, Aufwandmenge, Anwendungstechnik, Wartezeit, Wichtige Hinweise, Auflagen
<b>Gräser (zur Saatguterzeugung), Freiland Ab BBCH 13</b> Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	<b>Rostpilze, Pilzliche Blattfleckererreger</b> - 1,0 l/ha in 200 bis 400 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 1, in der Kultur bzw. je Jahr: 1 - Spritzen
<b>Tabak, Freiland Ab BBCH 33</b> Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis	<b>Blauschimmel (<i>Peronospora tabacina</i>)</b> - 1,0 l/ha in 300 bis 900 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2 - Spritzen - 14 Tage
<b>Tabak, Freiland Ab BBCH 64</b> Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis	<b>Echter Mehltau (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)</b> - 1,0 l/ha in 300 bis 900 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2 - Spritzen - 14 Tage
<b>Erdbeere, Freiland BBCH 56-67</b>	<b><i>Colletotrichum</i>, Fruchtfäule</b> - 1,0 l/ha in max. 2.000 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 10-14 Tage - Spritzen, Reihenbehandlung mit Dreidüsengabel - 3 Tage <b>WW750</b>
<b>Erdbeere, Gewächshaus BBCH 56-67</b>	<b><i>Colletotrichum</i>, Fruchtfäule</b> - 1,0 l/ha in max. 2.000 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 10-14 Tage - Spritzen - 3 Tage <b>WW750</b>
<b>Zierpflanzen, Freiland Ab BBCH 13</b> Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	<b>Pilzliche Blattfleckererreger, Echte Mehltäupilze</b> - Pflanzengröße bis 50 cm: 1,0 l/ha in 600 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 8-12 Tage - Spritzen - N
<b>Zierpflanzen, Gewächshaus Ab BBCH 13</b> Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	<b>Pilzliche Blattfleckererreger</b> - Pflanzengröße bis 50 cm: 1,0 l/ha in 600 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 8-12 Tage - Spritzen - N

Kultur/ Anwendungszeitpunkt	Schadorganismus, Aufwandmenge, Anwendungstechnik, Wartezeit, Wichtige Hinweise, Auflagen
<p><b>Echte Kamille, Freiland (Blatt- und Blütennutzung, Verwendung als teeähnliches Erzeugnis/ Arzneipflanze), BBCH 49-55</b> Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen</p>	<p><b>Echte Mehltaupilze</b> - 1,0 l/ha in 200 bis 600 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 8-12 Tage - Spritzen - 7 Tage <b>WW750, WW764</b></p>
<p><b>Spitzwegerich, Freiland, (Blatt- und Blütennutzung, Verwendung als teeähnliches Erzeugnis/Arzneipflanze) BBCH 39-51</b> Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen</p>	<p><b>Echte Mehltaupilze</b> - 1,0 l/ha in 200 bis 600 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 8-12 Tage - Spritzen - 7 Tage <b>WW750, WW764</b></p>
<p><b>Gemeine Ringelblume, Freiland, (Blatt- und Blütennutzung, Verwendung als teeähnliches Erzeugnis/Arzneipflanze) BBCH 49-55</b> Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen</p>	<p><b>Echte Mehltaupilze</b> - 1,0 l/ha in 200 bis 600 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 8-12 Tage - Spritzen - 7 Tage <b>WW750, WW764</b></p>
<p><b>Minze-Arten Freiland, (Blatt- und Blütennutzung, Verwendung als teeähnliches Erzeugnis/Arzneipflanze) BBCH 39-51</b> Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen</p>	<p><b>Pfefferminzen-Rost (<i>Puccinia menthae</i>)</b> - 1,0 l/ha in 200 bis 600 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 8-12 Tage - Spritzen - 7 Tage <b>WW750, WW764</b></p>
<p><b>Gewürzfenchel, Freiland, (Samen- und Fruchtnutzung, Nutzung als Gewürz) BBCH 49-59</b> Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen bis kurz vor der Blüte der Hauptdolde</p>	<p><b>Pilzliche Doldenerkrankungen</b> - 1,0 l/ha in 200 bis 600 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 8-12 Tage - Spritzen - F <b>WW750, WW764</b></p>

Kultur/ Anwendungszeitpunkt	Schadorganismus, Aufwandmenge, Anwendungstechnik, Wartezeit, Wichtige Hinweise, Auflagen
<b>Kümmel (Samen- und Fruchtnutzung, Nutzung als Gewürz), Freiland BBCH 49-59</b> Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen bis kurz vor der Blüte der Hauptdolde	<b>Pilzliche Doldenerkrankungen, Echte Mehltapilze</b> - 1,0 l/ha in 200 bis 600 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 7-14 Tage - Spritzen - F <b>WW750, WW764</b>
<b>Johanniskraut, Freiland (Blatt- und Blütennutzung, Verwendung als teeähnliches Erzeugnis/ Arzneipflanze) Ab BBCH 12</b> Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen	<b>Johanniskrautwelke (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)</b> - 1,0 l/ha in 200 bis 600 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 7-14 Tage - Spritzen - 35 Tage <b>WW750, WW764</b>
<b>Schnittmangold, Stielmangold, Freiland</b> Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	<b>Pilzliche Blattfleckererreger</b> - 1,0 l/ha in max. 600 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 3, in der Kultur bzw. je Jahr: 3, Abstand: 8-12 Tage - Spritzen - 21 Tage <b>WW764</b>
<b>Erbse, Freiland Ab BBCH 30</b> Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	<b>Echter Mehltau (<i>Erysiphe pisi</i>), Brennfleckenkrankheit (<i>Ascochyta pisi</i>), Brennfleckenkrankheit (<i>Mycosphaerella pinodes</i>), Brennfleckenkrankheit (<i>Phoma medicaginis</i> var. <i>pinodella</i>), Falscher Mehltau (<i>Peronospora pisi</i>), <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>, <i>Botrytis cinerea</i>, Rostpilze</b> - 1,0 l/ha in 200 bis 600 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 10-14 Tage - Spritzen - 14 Tage
<b>Artischocke, Freiland Ab BBCH 13</b> Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	<b>Pilzliche Blattfleckererreger</b> - Pflanzengröße bis 50 cm: 0,75 l/ha in 400 bis 600 l/ha Wasser Pflanzengröße 50 bis 125 cm: 1,0 l/ha in 400 bis 600 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2, Abstand: 7-14 Tage - Spritzen - 7 Tage <b>WW750, WW764</b>

Kultur/ Anwendungszeitpunkt	Schadorganismus, Aufwandmenge, Anwendungstechnik, Wartezeit, Wichtige Hinweise, Auflagen
<b>Stielmus, Kohlgemüse, Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.), Kohlrübe, Radieschen, Rettich, Erbse, Salat-Arten (Nutzung als Baby-Leaf-Salat), Freiland</b> <b>Ab BBCH 13</b> Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis	<b>Pilzliche Blattfleckenerreger</b> - 1,0 l/ha in 200 bis 600 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 1, in der Kultur bzw. je Jahr: 1 - Spritzen - 7 Tage
<b>Frische Kräuter, Gewächshaus</b> <b>Ab BBCH 13</b> Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	<b>Pilzliche Blattfleckenerreger, Falsche Mehltaupilze (<i>Peronosporaceae</i>), Rostpilze</b> - 1,0 l/ha in 200 bis 600 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2; Abstand 8-12 Tage - Spritzen - 14 Tage
<b>Feldsalat, Freiland</b> <b>Ab BBCH 13</b> Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis	<b>Falscher Mehltau (<i>Peronospora valerianellae</i>), <i>Rhizoctonia solani</i></b> - 1,0 l/ha in 200 bis 600 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen: in der Anwendung: 2, in der Kultur bzw. je Jahr: 2; Abstand 8-12 Tage - Spritzen - 14 Tage

**Wartezeit F:** Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.

**Wartezeit N:** Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung.

**WW750:** Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

**WW764:** Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel im Wechsel mit anderen Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen verwenden.

#### VON DER ZULASSUNGSBEHÖRDE FESTGESETZTE ANWENDUNGSBESTIMMUNGEN

**NW468:** Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder Packungen sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle.

**NW604:** Die Anwendungsbestimmung, mit der ein Abstand zum Schutz von Oberflächengewässern festgesetzt wurde, gilt nicht in den durch die zuständige Behörde besonders ausgewiesenen Gebieten, soweit die zuständige Behörde dort die Anwendung genehmigt hat.

**Für die Anwendung in Ackerbohne, Bete, Blattkohl, Bleichsellerie (Freiland), Blumenkohl, Buschbohne, Dicke Bohne, Endivien, Erbse, Futtererbse, Futterrübe, frische Kräuter, Gemüsefenchel, Gurke (Freiland), Knoblauch, Knollensellerie, Kohlrübe, Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl), Kürbis-Hybriden, Lupine-Arten, Meerrettich, Pastinak, Patisson, Phacelia, Porree, Radieschen, Rettich, Rosenkohl (Kohlschwärze, Weißer Rost, *Mycosphaerella brassiciola*), Rucola-Arten, Salate, Schalotte, Schnitt-/Stielmangold, Schnittlauch, Schwarzwurzel, Spargel, Speiserübe (Stoppelrübe, Mairübe etc.), Speisezwiebel, Stangenbohne, Tabak, Topinambur, Wurzelpetersilie, Wurzelichorie, Zierpflanzen (Freiland), Zucchini, Zuckerrübe, Zwiebelgemüse gilt:**

**NW605:** Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den unten aufgeführten Abdriftminderungsklassen der verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten. Für die mit „\*“ gekennzeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, § 6 Absatz 2 Satz 2 PflSchG zu beachten.  
**Ackerbohne, Bete, Blattkohl, Bleichsellerie (Freiland), Blumenkohl, Buschbohne, Dicke Bohne, Endivie, Erbse, Futtererbse, Futterrübe, Frische Kräuter, Gemüfefenchel, Gurke (Freiland), Knoblauch, Knollensellerie, Kohlrübe, Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl), Kürbis-Hybriden, Lupine-Arten, Meerrettich, Pastinak, Patisson (genießbare Schale), Phacelia (Saatguterzeugung), Porree, Radieschen, Rettich, Rucola-Arten, Salate, Schalotte, Schnitt-/Stielmangold, Schnittlauch (Bulbenanzucht), Schwarzwurzel, Spargel, Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.), Speisezwiebel, Stangenbohne (bis 50 cm), Wurzelpetersilie, Wurzelzichorie, Zierpflanzen (Echte Mehлтаupilze, bis 50 cm, Freiland), Zucchini, Zuckerrübe, Zwiebelgemüse:**

**Reduzierte Abstände:** 50 % 5 m; 75 % \*; 90 % \*

**Spargel, Tabak**

**Reduzierte Abstände:** 50 % 5 m; 75 % 5 m; 90 % \*

**Rosenkohl (Kohlschwärze, Weißer Rost, *Mycosphaerella brassiciola*), Topinambur, Zierpflanzen (Rostpilze, über 50 cm, Freiland):**

**Reduzierte Abstände:** 50 % 10 m; 75 % 5 m; 90 % \*

**Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm):**

**Reduzierte Abstände:** 50 % 15 m; 75 % 10 m; 90 % 5 m

**Für die Anwendung in Artischocke, Echte Kamille, Feldsalat, Gemeine Ringelblume, Gewürzfenchel, Johanniskraut, Kartoffel, Kohlrabi, Kümmel, Minze-Arten, Rosenkohl (*Alternaria brassicae*), Spitzwegerich gilt:**

**NW605-1:** Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den unten aufgeführten Abdriftminderungsklassen der verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten. Für die mit „\*“ gekennzeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, das Verbot der Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu beachten.

**Echte Kamille, Feldsalat, Gemeine Ringelblume, Gewürzfenchel, Johanniskraut, Kartoffel, Kohlrabi, Kümmel, Minze-Arten, Spitzwegerich:**

**Reduzierte Abstände:** 50 % 5 m; 75 % \*; 90 % \*

**Artischocke, Rosenkohl (*Alternaria brassicae*)**

**Reduzierte Abstände:** 50 % 10 m; 75 % 5 m; 90 % \*

**Für die Anwendung in Ackerbohne, Artischocke, Beten, Blattkohle, Blumenkohl, Buschbohne, Dicke Bohne, Echte Kamille, Endivien, Erbse, Feldsalat, frische Kräuter, Futtererbse, Futterrübe, Gemeine Ringelblume, Gemüfefenchel, Gewürzfenchel, Gurke (Freiland), Johanniskraut, Kartoffel, Knoblauch, Knollensellerie, Kohlrabi, Kohlrübe, Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl), Kümmel, Kürbis-Hybriden, Lupine-Arten, Meerrettich, Minze-Arten, Pastinak, Patisson, Phacelia, Porree, Radieschen, Rettich, Rosenkohl, Rucola-Arten, Salate, Schalotte, Schnitt-/Stielmangold, Schnittlauch, Schwarzwurzel, Spargel, Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.), Speisezwiebel, Spitzwegerich, Stangenbohne, Tabak, Topinambur, Wurzelpetersilie, Wurzelzichorie, Zierpflanze, Zucchini, Zuckerrübe, Zwiebelgemüse gilt:**

**NW606:** Ein Verzicht auf den Einsatz verlustmindernder Technik ist nur möglich, wenn bei der Anwendung des Mittels mindestens unten genannter Abstand zu Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - eingehalten wird. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.

**Ackerbohne, Beten, Blattkohle, Blumenkohle, Buschbohne, Dicke Bohne, Echte Kamille, Endivien, Erbse, Feldsalat, Frische Kräuter, Futtererbse, Futterrübe, Gemeine Ringelblume, Gemüfefenchel, Gewürzfenchel, Gurke (Freiland), Johanniskraut, Kartoffel, Knoblauch, Knollensellerie, Kohlrabi, Kohlrübe, Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl), Kümmel, Kürbis-Hybriden (genießbare Schale), Lupine-Arten, Meerrettich, Minze-Arten, Pastinak, Patisson (genießbare Schale), Phacelia (Saatguterzeugung), Porree, Radieschen, Rettich, Rucola-Arten, Salate, Schalotte, Schnitt-/Stielmangold, Schnittlauch, Schwarzwurzel, Spargel, Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.), Speisewiebel, Spitzwegerich, Stangenbohne (bis 50 cm), Tabak, Wurzelpetersilie, Wurzelzichorie, Zierpflanze (Freiland), Zucchini, Zuckerrübe, Zwiebelgemüse:**

**Abstand:** 5 m

Artischocke, Rosenkohl, Topinambur, Zierpflanzen (Pflanzenhöhe über 50 cm):

**Abstand:** 15 m

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm):

**Abstand:** 20 m

**Für die Anwendung in Hopfen gilt:**

**NW607-1:** Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den unten aufgeführten Abdriftminderungsklassen der verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten. Für die mit „\*“ gekennzeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, das Verbot der Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu beachten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.

**Abstand:** 50 % 20 m; 75 % 15 m; 90 % 10 m

**Für die Anwendung in der Erdbeere gilt:**

**NW608:** Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - muss mindestens mit unten genanntem Abstand erfolgen. Unabhängig davon ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, § 6 Absatz 2 Satz 2 PflSchG zu beachten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.

**Abstand:** 5 m

**Für die Anwendung in Chicoree, Gräser, Raps, Zierpflanzen (Rostpilze, bis 50 cm, Freiland) gilt:**

**NW609:** Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - muss mindestens mit unten genanntem Abstand erfolgen. Dieser Abstand muss nicht eingehalten werden, wenn die Anwendung mit einem Gerät erfolgt, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Unabhängig davon ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, § 6 Absatz 2 Satz 2 PflSchG zu beachten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu 50.000 Euro geahndet werden.

**Abstand:** 5 m

**Für die Anwendung in Erbse, Kartoffel, Kohlgemüse, Kohlrübe, Radieschen, Rettich, Salat-Arten (Nutzung als Baby-Leaf-Salat), Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.), Stielmus gilt:**

**NW609-1:** Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - muss mindestens mit unten genanntem Abstand erfolgen. Dieser Abstand muss nicht eingehalten werden, wenn die Anwendung mit einem Gerät erfolgt, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Unabhängig davon ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, das Verbot der Anwendung unmittelbar in oder an Gewässern in jedem Fall zu beachten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu 50.000 Euro geahndet werden.

**Abstand:** 5 m

**Für die Anwendung in Möhre gilt:**

**NW642:** Die Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern oder Küstengewässern ist nicht zulässig (§ 6 Absatz 2 PflSchG). Unabhängig davon ist der gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebene Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.

**Für die Anwendung in Ackerbohne, Artischocke, Beten, Bleichsellerie (Freiland), Blumenkohl, Buschbohne, Chicoree, Dicke Bohne, Echte Kamille, Erbse, Erdbeere (Freiland), Feldsalat, Frische Kräuter Gemeine Ringelblume, Gemüsefenchel, Gewürzfenchel, Gräser, Gurke (Freiland), Hopfen, Johanniskraut, Knollensellerie, Kohlgemüse, Kohlrabi, Kohlrübe, Kohlrübe, Kümmel, Kürbis-Hybriden (genießbare Schale), Lupine-Arten, Meerrettich, Minze-Arten, Möhren, Pastinak, Patisson (genießbare Schale), Phacelia (Saatguterzeugung), Radieschen, Radieschen, Rettich, Rosenkohl, Rucola-Arten, Salat-Arten (Nutzung als Baby-Leaf-Salat), Schnittlauch (Bulbenanzucht), Schwarzwurzel, Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.), Spitzwegerich, Stielmus, Tabak (Blauschimmel), Topinambur, Wurzelpetersilie, Wurzelzichorie, Zierpflanzen, Zucchini, gilt:**

**NW701:** Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch wasserführender - muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen Schutzfunktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 10 m haben. Dieser Randstreifen ist nicht erforderlich, wenn:

- ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässermünden, bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder
- die Anwendung im Mulch oder Direktsaatverfahren erfolgt.

**Für die Anwendung in Blattkohl, Endivien, Futterrübe, Futtererbse, Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl), Salat und Zuckerrübe gilt:**

**NW705:** Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch wasserführender - muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen Schutzfunktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 5 m haben. Dieser Randstreifen ist nicht erforderlich, wenn:

- ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässermünden, bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder
- die Anwendung im Mulch oder Direktsaatverfahren erfolgt.

**Für die Anwendung in Knoblauch, Porree, Schalotte, Schnitt-/Stielmangold, Spargel, Speisezwiebel, Stangenbohne, Zierpflanze (Freiland), Zwiebelgemüse gilt:**

**NW706:** Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch wasserführender - muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen Schutzfunktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 20 m haben. Dieser Randstreifen ist nicht erforderlich, wenn:

- ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer münden, bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder
- die Anwendung im Mulch oder Direktsaatverfahren erfolgt.

**Für die Anwendung in Zierpflanzen (gegen Rostpilze, Freiland) gilt:**

**NW800:** Keine Anwendung auf gedrahteten Flächen zwischen dem 01. November und dem 15. März.

**Für die Anwendung beim Legen der Kartoffel (*Rhizoctonia solani*, *Colletotrichum coccodes*) gilt:**

**NG340-1:** Auf derselben Fläche im folgenden Kalenderjahr keine Anwendung von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff Azoxystrobin.

**Für die Anwendung beim Legen der Kartoffel (*Rhizoctonia solani*, *Colletotrichum coccodes*) gilt:**

**NG405:** Keine Anwendung auf drainierten Flächen.

**Für die Anwendung in Stangenbohne gilt:**

**NT104:** Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzenden Flächen (ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung, min. in die Abdriftminderungskategorie 50 % eingetragen ist. Ist der Einsatz verlustmindernder Technik nicht möglich, muss bei der Anwendung ein Abstand von mindestens 5 m zu angrenzenden Flächen (ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) eingehalten werden. Bei der Anwendung des Mittels ist weder der Einsatz verlustmindernder Technik noch die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m erforderlich, wenn die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind oder die Anwendung des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im „Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile“ vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der jeweils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist. Bei der Anwendung des Mittels ist ferner die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m nicht erforderlich, wenn angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) nachweislich auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen angelegt worden sind.

**Für die Anwendung in Hopfen gilt:**

**NT107:** Bei der Anwendung des Mittels muss ein Abstand von mindestens 5 m zu angrenzenden Flächen (ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) eingehalten werden. Zusätzlich muss die Anwendung in einer darauf folgenden Breite von mindestens 20 m mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung, min. in die Abdriftminderungskategorie 50% eingetragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist weder der Einsatz verlustmindernder Technik noch die Einhaltung eines Abstandes von min. 5 m erforderlich, wenn die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind. Bei der Anwendung des Mittels ist ferner die Einhaltung eines Abstandes von min. 5 m nicht erforderlich, wenn die Anwendung des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im „Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile“ vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der jeweils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit ei-

nem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) nachweislich auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen angelegt worden sind.

## **RESISTENZMANAGEMENT**

**WW7091:** Bei wiederholten Anwendungen des Mittels oder von Mitteln derselben Wirkstoffgruppe können Wirkungsminderungen eintreten oder eingetreten sein. Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen verwenden. Sollte trotz empfehlungsgerechter Anwendung von Zaftra® AZT 250 SC ein vorzeitiger Wirkungsabfall eingetreten sein, ist sofort mit entsprechenden Fungiziden einer anderen Wirkstoffgruppe weiterzubehandeln. Im Falle eines Wirkungsrückganges, der im Einzelfall nicht vorhersehbar ist, kann keine Haftung übernommen werden.

### **Empfehlungen zum Einsatz:**

- Zaftra® AZT 250 SC muss protektiv/vorbeugend und mit der vollen zugelassenen Aufwandmenge eingesetzt werden.
- Maximal zwei Behandlungen mit Produkten aus der Wirkstoffgruppe der Strobilurine und anderen kreuzresistenten Wirkstoffen pro Jahr durchführen. Im Jungpflanzenbereich vorgenommene Anwendungen sind hierbei unbedingt mit zu berücksichtigen (ggf. Rücksprache mit Jungpflanzenlieferanten).

## **HINWEISE ZUR SACHGERECHTEN ANWENDUNG**

### **Wichtige Hinweise**

- Kulturen, die unter Stress stehen, nicht behandeln. Mögliche Gründe von Stress können schlechte Boden- oder Kulturbedingungen, ungünstige klimatische Verhältnisse, Staunässe, Trockenheit, Schädlinge, Krankheitsbefall oder Nährstoffmangel sein.
- Aufgrund der protektiven Wirkung sollte Zaftra® AZT 250 SC vor oder zu Infektionsbeginn angewendet werden.

### **Empfehlungen bzw. Einschränkungen für die Anwendung von Zaftra® AZT 250 SC unter Glas:**

- Zaftra® AZT 250 SC alleine ausbringen, nicht mit anderen Produkten mischen.
- Keine Anwendung im Winter (November bis März).
- Anwendung frühestens drei Wochen nach dem Verpflanzen.
- Bedingungen nach der Anwendung sollten ein schnelles Antrocknen des Spritzbelages ermöglichen.
- Keine Anwendung unter kühlen Bedingungen und hoher relativer Luftfeuchte (z. B. in den Abendstunden), insbesondere bei schlechter Ventilation.

### **Furchenbehandlung beim Legen der Kartoffeln:**

Auf sorptionsstarken Böden (hoher Ton- oder Humusgehalt) kann es zu Wirkungsminderungen kommen. Der Einsatz von Zaftra® AZT 250 SC bei der Pflanzung von Kartoffeln ist geeignet, den Befallsdruck zu verringern. Er ist aber als alleinige Maßnahme zur Verhinderung des Krankheitsbefalls und der Knollenschädigung nicht immer ausreichend.

Vor Frost schützen!

Zur Verhinderung von Schädigungen empfindlicher Kulturen Zaftra® AZT 250 SC keinesfalls in Kernobst einsetzen und Abdrift auf Kernobstkulturen vermeiden, da das Produkt für bestimmte Apfelsorten nicht verträglich ist. Spritzgeräte und Hilfsmittel, wie z. B. Messbecher, mit denen Zaftra® AZT 250 SC ausgebracht wurde, nicht im Kernobstbau oder in Kernobstbaumschulen verwenden.

## **NACHBAU**

Nach dem Einsatz von Zaftra® AZT 250 SC als Überkopffapplikation können alle Kulturen in der Fruchtfolge (auch bei vorzeitigem Umbruch) nachgebaut werden.

Nach vorzeitigem Umbruch von Kartoffelbeständen, die mit 3,0 l/ha Zaftra® AZT 250 SC bei der Pflanzung behandelt wurden, können auf diesen Flächen erneut Kartoffeln angebaut werden. Keine erneute Behandlung der Nachbaukultur mit Zaftra® AZT 250 SC! Für den Anbau anderer Kulturen bitte Fachberatung einholen. Im Rahmen der üblichen ackerbaulichen Fruchtfolge können nach bestimmungsgemäßen und sachgerechten Anwendung von Zaftra® AZT 250 SC zur Furchenbehandlung in Kartoffeln (Anwendung vor dem 1. Juli) alle ackerbaulichen Kulturen nachgebaut werden.

## ANWENDUNGSTECHNIK

### Ausbringgerät

Spritzgerät regelmäßig auf einem Prüfstand testen lassen. Gerät auslitern und den gewünschten Düsenausstoß kontrollieren. Es ist sinnvoll, eine genaue Behälterskala am Spritztank anzubringen (beim Gerätehersteller erhältlich).

### Furchenbehandlung beim Legen der Kartoffeln

Das Pflanzgerät ist mit speziellen Düsen auszurüsten, die eine Ausbringung der Spritzflüssigkeit in den Boden ohne Benetzung der Pflanzknollen ermöglichen. Bewährt haben sich dabei 2 oder 3 Weitwinkel- oder Zungendüsen mit einer Verteilung von 1/3 der Wassermenge vor die Knollenablage in die offene Furche und 2/3 hinter der Knollenablage in den Erdstrom der Zudeckorgane. Der Spritzwinkel ist so einzustellen, dass das Abfließen überschüssiger Spritzflüssigkeit an den Scharen der Pflanzmaschine minimiert wird.

### Berechnungsbeispiel der Spritzflüssigkeitsmenge für Ausbringung mit drei gleichen Düsen an der Pflanzmaschine (eine vor und zwei hinter der Knollenablage)

Für eine Ausbringmenge von ca. 200 l/ha bei 0,75 m Reihenabstand (angestrebte Verteilung 1/3 vorne und 2/3 hinten) können vorne eine Düse der Größe 0,75 und hinten zwei Düsen der Größe 0,75 verwendet werden. Bei einem Druck von 2 bar (Ausstoß 0,48 l/min / Düse) und 6 km/h Fahrgeschwindigkeit werden ca. 192 l/ha ausgebracht. Bsp. (s. Formel unter Tabelle):  $(3 \times 0,48 \times 600) / (6 \times 0,75) = 192$  l/ha. Die beiden hinteren Düsen können auch durch eine Düse der Größe 1,5 ersetzt werden.

### Empfohlene Weitwinkel-/Zungendüsen für die Furchenanwendung:

Düsentyp L/min bei	0,5	0,75	1,0	1,5
1,0 bar	0,23	0,34	0,46	0,68
1,5 bar	0,28	0,42	0,56	0,84
2,0 bar	0,32	0,48	0,65	0,97
2,5 bar	0,36	0,54	0,72	1,08

Ausbringmenge  $\left(\frac{l}{ha}\right) = \frac{\text{Ausstoß aller Düsen (l/min)} \times 600}{\text{Fahrgeschwindigkeit (km/h)} \times \text{Arbeitsbreite (m)}}$

### Ansetzvorgang

Spritzflüssigkeitsreste sind zu vermeiden. Es ist nur so viel Spritzflüssigkeit anzusetzen, wie tatsächlich benötigt wird. Es ist daher sinnvoll, die erforderliche Spritzflüssigkeitsmenge genau zu berechnen. Insbesondere bei größeren Spritzbehältern bietet sich die Verwendung eines Durchflussmengenmessgerätes bei der Tankbefüllung an. Beim Ansetzvorgang wird die Verwendung von üblicher Schutzausrüstung empfohlen.

1. Tank mit der Hälfte der benötigten Wassermenge füllen.
2. Rührwerk einschalten (Nennzahl).
3. Produkt vor dem Einfüllen kräftig schütteln!

Hinweis für die Entnahme von Teilmengen:

Produkt vor der Entnahme von Teilmengen wie folgt durchmischen, anderenfalls ist die homogene Verteilung des Wirkstoffes im Gebinde nicht sichergestellt:

- Es ist wichtig, den Kanisterinhalt sowohl in der Quer- als auch in der Längsrichtung gründlich zu durchmischen.
- Unabhängig von der Gebindegröße erreicht man eine gute Durchmischung durch Konstruktion einer einfachen Kippvorrichtung. Dazu wird der Kanister mit der Längsseite mittig auf z. B. ein Holzstück oder Rohr mit ca. 10 cm Durchmesser aufgelegt. Anschließend den Kanister an beiden Enden greifen und den Inhalt durch kräftige Auf- und Ab- Bewegungen intensiv durchmischen (min. 20 s je Längsseite). Diesen Vorgang über alle Längsseiten mehrfach wiederholen.
- Ausschließlich bei Verwendung des gesamten Gebindes kann das Produkt durch ein anderes als das oben beschriebene Durchmischungsverfahren kräftig geschüttelt werden.

4. Produkt über die Einspülvorrichtung oder direkt in den Tank geben.
5. Entleerte Präparatbehälter sorgfältig ausspülen und Spülwasser der Spritzflüssigkeit beigeben.
6. Tank mit Wasser auffüllen.
7. Spritzflüssigkeit sofort nach dem Ansetzen bei laufendem Rührwerk ausbringen.

### **Mischbarkeit**

Bei Anwendungen im Gewächshaus Zaftra® AZT 250 SC nicht in Mischungen ausbringen. Zaftra® AZT 250 SC ist physikalisch mit einer Reihe anderer Produkte verträglich. Jedoch wurden die Wirksamkeit und die Pflanzenverträglichkeit der Mischungen nicht in Versuchen bestätigt.

Mischpartner in fester Form werden als Erstes in den Tank gegeben.

Im Gemüse- und Zierpflanzenbau wird wegen der Vielfalt von Arten und Sorten und der unterschiedlichen Kulturbedingungen dringend empfohlen, vor der Ausbringung von Mischungen einen Probeinsatz an Einzelpflanzen vorzunehmen. Es wird empfohlen Zaftra® AZT 250 SC in Chinakohl und Pak Choi nicht in Tankmischungen, auch nicht mit Blattdüngern, anzuwenden. Geschwächte Bestände sind von der Behandlung auszuklammern.

Mischungen mit AHL (Ammonnitrat-Harnstoff-Lösung), Ölen oder Netzmitteln können zu Schäden führen.

Mischungen mit AHL in Kartoffeln und Zuckerrüben bis max. 10 kg N bzw. 28 l AHL/ha, nur in AHL-Wassergemischen im Verhältnis von min. 1:9.

Mischungen in Zuckerrüben nur ab Reihenschluss.

Mischungen im Raps bis max. 15 kg N bzw. 42 l AHL/ha in AHL-Wassergemischen von min. 1:3.

Mischungen umgehend ausbringen. Standzeiten vermeiden. Während der Arbeitspausen Rührwerk laufen lassen.

Die Hinweise zur Mischbarkeit in den Gebrauchsanleitungen der Mischpartner sind zu beachten. Da nicht alle in der Praxis vorkommenden Gegebenheiten, welche die Mischbarkeit, Wirksamkeit und Verträglichkeit einer Tankmischung im Einzelfall beeinflussen können, vorherzusehen sind, wird ein Versuch in kleinen Mengen empfohlen. Für gegebenenfalls auftretende negative Auswirkungen durch nicht empfohlene Tankmischungen, speziell Mehrfachmischungen, wird keine Haftung übernommen, da nicht alle in Frage kommenden Mischungen geprüft werden können.

### **Spritztechnik**

Beim Ausbringen von Zaftra® AZT 250 SC ist auf eine gute, gleichmäßige Verteilung der Spritzbrühe zu achten.

Furchenbehandlung beim Legen der Kartoffeln:

Eine direkte Benetzung des Pflanzguts mit Zaftra® AZT 250 SC muss aus Verträglichkeitsgründen vermieden werden. Dazu ist die Spritzflüssigkeit mit speziell am Legegerät angeordneten Düsen vor und nach der Knollenablage unmittelbar in den Boden zu applizieren. Bewährt hat sich dabei eine Verteilung von 1/3 der Wassermenge vor und 2/3 hinter der Knollenablage in den Erdstrom beim Abdecken der Pflanzknollen.

Die unsachgemäße Anwendung von Zaftra® AZT 250 SC bei der Kartoffelpflanzung kann zu Auflaufverzögerungen oder Fehlstellen führen, deren Symptome denen unzureichender Pflanzgutqualität ähneln können. Es empfiehlt sich daher, Behandlungsfenster ohne Furchenbehandlung mit Zaftra® AZT 250 SC anzulegen. Eine solche Maßnahme erlaubt es, den Pflanzenaufgang in Abhängigkeit von Behandlung, Pflanzgutqualität und Umweltbedingungen zu erfassen und über weitere ackerbauliche Maßnahmen zu entscheiden.

### **Wasseraufwandmengen**

#### **Hopfen (in Abhängigkeit vom Kulturstadium):**

1.000 - 4.000 l/ha im Spritzverfahren bzw. 700 - 2.700 l/ha im Sprühverfahren (1,5-fach konzentriert).

#### **Kartoffel:**

Blattspritzung: Bewährte Wasseraufwandmenge 300 - 400 l/ha. Bei Kartoffeln mit starker Krautentwicklung sollte eine höhere Wasseraufwandmenge genommen werden.

**Furchenbehandlung:** Wasseraufwandmenge von 200 l/ha nicht überschreiten, um eine zu starke Benetzung der Knollen durch Abdrift und eine Flüssigkeitsansammlung in den Augen der Pflanzknollen zu vermeiden.

**Raps:** Bewährte Wasseraufwandmenge 200 - 400 l/ha.

**Zuckerrübe:** Bewährte Wasseraufwandmenge 200 - 400 l/ha.

**Spargel:** 600 - 1.000 l/ha

**Gurken und Zucchini im Freiland:** 400 - 600 l/ha

**Gurken und Tomaten im Gewächshaus:**

- bis 50 cm Pflanzenhöhe 600 l/ha
- von 50 bis 125 cm Pflanzenhöhe 900 l/ha
- über 125 cm Pflanzenhöhe 1.200 l/ha

**Zierpflanzen:**

- bis 50 cm Pflanzenhöhe 600 l/ha
- von 50 bis 125 cm Pflanzenhöhe 900 l/ha
- über 125 cm Pflanzenhöhe 1.200 l/ha

**Ausbringung**

Bei Anwendung sind die Grundsätze der guten fachlichen Praxis zu beachten! Abdrift oder sonstiger Eintrag in Gewässer und auf benachbarte

Nichtzielflächen sind durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden. Angesetzte Spritzflüssigkeit nicht für längere Zeit im Spritzfass stehen lassen. Eine ständige Kontrolle des Spritzflüssigkeitsverbrauches während der Ausbringung in Bezug zur behandelten Fläche wird empfohlen. Ein Durchfluss- und Dosiermessgerät bietet sich als technisches Hilfsmittel an. Während der Fahrt und während der Ausbringung Rührwerk laufen lassen. Nach Arbeitspausen Spritzbrühe erneut sorgfältig aufrühren.

**Schadenverhütung**

Überdosierung und Abdrift vermeiden. Zaftra® AZT 250 SC ist für einige Apfelsorten unverträglich, daher insbesondere Abdrift auf Kernobstkulturen vermeiden. Zaftra® AZT 250 SC niemals in Kernobstgehölzen oder Kernobstbaumschulen anwenden. Spritzgeräte, mit denen Zaftra® AZT 250 SC ausgebracht wurde, nicht für Apfelkulturen verwenden.

**GERÄTEREINIGUNG**

Nach Beendigung der Spritzung muss das Gerät sorgfältig gespült werden:

1. Technisch unvermeidbare Restmenge im Verhältnis von min. 1:10 mit Wasser verdünnen und bei laufendem Rührwerk auf der zuvor behandelten Fläche ausbringen.
2. Ca. 10 bis 20 % des Tankinhaltes mit Wasser auffüllen und dabei die Innenflächen des Tanks mit dem Wasserstrahl, am besten unter Einsatz einer integrierten Reinigungsdüse, abspritzen und das Rührwerk für min. 15 Minuten einschalten. Anschließend die Flüssigkeit bei laufendem Rührwerk durch die Düsen auf der behandelten Fläche verspritzen.
3. Ca. 10 % des Tankinhaltes mit Wasser auffüllen und dabei Innenflächen des Tanks, wie oben beschrieben, abspritzen. Rührwerk für 10 Minuten einschalten. Anschließend die Flüssigkeit bei laufendem Rührwerk durch die Düsen auf der behandelten Fläche verspritzen.

Die grobe Reinigung der Spritzen mit Wasser und Waschbürste auf dem Feld vornehmen. Reinigungswasser nicht über die Hofabläufe in die Kanalisation und Gewässer gelangen lassen.

**RESTMENGENVERWERTUNG**

Eventuell auftretende Reste der Spritzbrühe und der Gerätereinigung nie in die Kanalisation, sonstige Abflüsse oder im Freiland ablassen, sondern verdünnt auf einer behandelten Teilfläche ausbringen.

**KENNZEICHNUNG NACH CLP-VERORDNUNG**

**Signalwort:** Achtung

**Gefahrenpiktogramme:** GHS07, GHS09

**GEFAHRENHINWEISE**

**H332**            **Gesundheitsschädlich bei Einatmen.**

**H410**            **Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.**

**EUH208**        **Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.**

**EUH401**        **Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.**

## SICHERHEITSHINWEISE

- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
P261 Einatmen von Nebel, Aerosol vermeiden.  
P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.  
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.  
P501 Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung bzw. PAMIRA® zuführen.

## HINWEISE FÜR DEN SICHEREN UMGANG

### Hinweise für den Anwenderschutz

- SB001:** Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen.  
**SB010:** Für Kinder unzugänglich aufbewahren.  
**SF245-01:** Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten.

## HINWEISE ZUM SCHUTZ DER UMWELT

### Hinweise zum Wasserschutz

Zur Verhinderung des Eintrags von Präparatresten in Oberflächen-grundwasser müssen folgende Hinweise streng beachtet werden:

- Die grobe Reinigung der Spritzen auf dem Feld vornehmen.
- Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder Packungen sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle.

Die festgesetzten Anwendungsbestimmungen sind unbedingt einzuhalten. In einzelnen Bundesländern können generell strengere Abstandsauflagen (als in den Anwendungsbestimmungen festgesetzt) gelten. Diese sind in jedem Falle zu beachten.

### Schutz von Wasserorganismen

- NW262:** Das Mittel ist giftig für Algen.  
**NW264:** Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere.  
**NW265:** Das Mittel ist giftig für höhere Wasserpflanzen.

### Wirkung auf Bienen

- NB6641:** Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4).

### Schutz von Nutzorganismen

- NN130:** Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen der Arten *Pardosa amentata* und *palustris* (Wolfspinnen) eingestuft.  
**NN134:** Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen der Art *Typhlodromus pyri* (Raubmilbe) eingestuft.  
**NN1513:** Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen der Art *Orius laevigatus* (räuberische Blumenwanze) eingestuft.  
**NN161:** Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen der Art *Coccinella septempunctata* (Siebenpunkt-Marienkäfer) eingestuft.  
**NN165:** Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen der Art *Poecilus cupreus* (Laufkäfer) eingestuft.  
**NN170:** Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen der Art *Chrysoperla carnea* (Florfliege) eingestuft.  
**NN1842:** Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen der Art *Aphidius rhopalosiphii* (Brackwespe) eingestuft.  
**NN291:** Das Mittel wird als schwach schädigend für Populationen der Art *Episyrphus balteatus* (Schwebfliege) eingestuft.

## ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

**Allgemein:** Bewusstlosen Menschen niemals oral etwas zuführen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).

**Nach Einatmen:** Einatmen von Frischluft gewährleisten. Betroffene Person ausruhen lassen.

**Nach Hautkontakt:** In Mitleidenschaft gezogene Kleidung ablegen und alle betroffenen Hautpartien mit milder Seife und Wasser abwaschen, mit warmem Wasser nachspülen.

**Nach Augenkontakt:** Sofort mit viel Wasser ausspülen. Bei anhaltenden Schmerzen oder Rötungen, ärztliche Hilfe herbeiholen.

**Nach Verschlucken:** Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Notärztliche Hilfe herbeirufen.

## LAGERUNG

Getrennt von Lebens- und Futtermitteln sowie unzugänglich für Kinder und nur in der verschlossenen Originalverpackung an einem trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Entfernt von Zündquellen und direkter Sonnenbestrahlung aufbewahren.

Produkt nicht unter 4°C und nicht über 35°C lagern.

## ABFALLBESEITIGUNG

Verpackungen von Pflanzenschutzmitteln, Spritzenreinigern und Flüssigdüngern werden kostenfrei an den Sammelstellen des Rücknahmesystems PAMIRA zurückgenommen. Die gemeinsame Initiative von Herstellern und Handel, die flächendeckend in Deutschland durchgeführt wird, sorgt für eine kontrollierte und sichere Verwertung der zurückgenommenen Verpackungen.

Mittlerweile wird mit rund 85 % ein Großteil der gesammelten Verpackungen werkstofflich recycelt und zur Herstellung von Kabelschutzrohren eingesetzt.

Zurückgenommen werden Pflanzenschutz-Kanister aus Kunststoff und Metall sowie Faltschachteln, Papier- und Kunststoff-Säcke.

Die Verpackungen müssen

- restlos entleert,
- gespült,
- trocken und
- mit dem PAMIRA-Logo versehen sein.

Die Deckel und sonstigen Verpackungen sind getrennt abzugeben. Behälter über 50 Liter müssen durchtrennt sein. Die Sauberkeit der Verpackungen wird bei der Annahme kontrolliert.

Weitere Informationen sowie aktuelle Sammeltermine finden Sie unter: **[www.pamira.de](http://www.pamira.de)**

## ANMERKUNG

Wir haften für eine gleichbleibende Beschaffenheit des Mittels zum Zeitpunkt seiner Auslieferung aus unserem Lager. Die Beschaffenheit des Pflanzenschutzmittels, seine Wirkungsweise können aber Bedingungen unterliegen, auf die weder wir noch unsere Vertriebspartner Einfluss haben. Zu diesen Bedingungen können gehören: Vielfalt und Konstitution der Kulturen, Fruchtfolge, Boden- und Witterungsverhältnisse, Transport- und Lagerungsbedingungen, Menge, Anzahl, Methoden und Verhältnisse der Anwendung, Beigabe anderer Pflanzenschutzmittel oder Zusatzstoffe. Wir schließen die Haftung für solche Umstände und daraus resultierende Folgen aus. Wir weisen den Anwender des Pflanzenschutzmittels darauf hin, dass er gesetzlich verpflichtet ist, vor dem Erwerb und der Anwendung des Mittels sich sachkundig zu machen, beim beruflichen Anwender den Sachkundenachweis zu führen und die Anwendungsfähigkeit des Pflanzenschutzmittels unter Berücksichtigung der dafür festgesetzten Anwendungsgebiete und -bestimmungen zu prüfen.

Zaftra® ist eine eingetragene Marke von Globachem NV.

Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt und unter **[www.plantan.de](http://www.plantan.de)**.

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung bitte stets Etikett und Produktinformationen lesen.